

Lycopode claviforme (*Lycopodium clavatum* L.)

Aigaire, buis-de-sapin, courants-verts, égaire, griffe-de-loup, lycopode à poil, mousse-aumassues.

Common club-moss

Description générale :

- ramifications courtes et en forme de doigts.

Feuilles :

- feuilles vert foncé, en grand nombre, alternes, allongées, terminées par une longue soie blanche, arquées vers le haut et la soie retroussée.

Tiges :

- tiges horizontales : diamètre de 0,3 cm, robustes, très feuillées, arquées, très longues (quelques mètres) et portant quelques racines grossières et peu ramifiées. Émission de tiges dressées portant la fructification blanche.

Fructification :

- chaque longue queue porte 3 ou 4 strobiles de forme cylindrique, pourvu de nombreux sporanges tous insérés à la base d'une feuille modifiée triangulaire blanche. Sporangies en forme de croissant lunaire et jaune mais.

Habitat et distribution :

- forêts de conifères ou mixtes, les substrats sablonneux, secs et acides
- le long du fleuve Saint-Laurent, les régions tempérées mixtes

Saviez-vous que ...

Les spores récoltées à la fin de l'automne contiennent beaucoup de sucres et d'huiles. Lorsque l'on applique cette poudre sur une peau irritée, elle diminue la démangeaison.

Références :

- Lamoureux, G. *et al.* 1993. *Fougères, prêles et lycopodes*. Québec : Fleurbec