

Thélyptère fougère-du-hêtre (*Thelypteris phegopteris* (Linné))

Dryoptéride du hêtre, fougère-à-moustache, phégoptéris faux-polypode, polypode cilié, polypode connectile, polypode du hêtre, polypode phégoptère, polypode triangulaire.

Long beech-fern

Description générale :

- petite herbacée de 20 à 40 cm de hauteur, portant un seul type de frondes et formant des colonies denses d'un vert éclatant.

Fronde (feuille des fougères) :

- non ramifiée, arquée, divisée deux fois, triangulaire, mince, fragile; segments primaires alternes, ceux du bas opposés, pointe effilée et les 2 premiers segments à la base ont une orientation différente du reste; segments secondaires alternes, arrondis, poilus. Stipe plus foncé que le reste de la fougère et parfois rougeâtre aux extrémités.

Sores (amas de sporanges) :

- situés sous la fronde en bordure des segments secondaires, vert jaune avant la maturité et par la suite brun pâle. Sporangies (organe reproducteur produisant les spores) incolores bordés d'un anneau brun pâle.

Habitat et distribution :

- principalement dans les forêts à l'ombre des grands arbres mais aussi dans les talus d'éboulis, sur les rochers.
- générale au Québec.

Saviez-vous que...

En hiver, les crosses du thélyptère fougère du hêtre sont protégées par un épais manteau d'écailles brun foncé. Au printemps, en se déroulant, les crosses laissent tomber leurs écailles. Ces écailles couvrent également les jeunes stipes et le rachis, devenant plus espacées à mesure que ces derniers s'allongent.

Références :

- Lamoureux, G. *et al.* 1993. *Fougères, prêles et lycopodes*. Québec : Fleurbec.